

Чернівецький державний університет
ім. Ю. Федьковича

На правах рукопису

Возняк
Ольга Григорівна

**ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ
З ВИРОДЖЕННЯМИ**

01.01.02 - диференціальні рівняння

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук

Чернівці - 1995



00778325 (W)

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі крайових задач для рівнянь з постійними похідними (м.Чернівці) Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Подстригача НАН України.

Науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук,
професор С.Д.Івасишин

Офіційні опоненти - доктор фіз.-мат. наук,
професор М.А.Горбачук

кандидат фіз.-мат. наук,
доцент В.П.Лавренчук

Провідна організація - Львівський державний університет
ім.І.Франка

Захист відбудеться "28" *жовтня* 1995 р. о *10⁰⁰* годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 07.01.04 в Чернівецькому державному університеті за адресою: 274012, Чернівці-12,
вул. Університетська, 28, математичний факультет.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Чернівецького державного університету за адресою: вул. П.Українки, 23.

Автореферат розіслано "26" *вересня* 1995 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

А.М.Садов'як

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. На даний час для рівномірно параболічних за Петровським (і більш загальних) систем рівнянь з гладкими і обмеженими коефіцієнтами відомі досить повні результати. У випадку задачі Коші вони стосуються насамперед побудови та детального дослідження властивостей фундаментальних матриць розв'язків, дослідження коректної розв'язності задачі Коші в широких класах функціональних просторів та вивчення різних властивостей розв'язків, заданих у напіввідкритому шарі, зокрема дослідження їх інтегрального зображення і граничної поведінки при наближенні до початкової гіперплощини. У цьому напрямку є фундаментальні праці багатьох вітчизняних і зарубіжних математиків, зокрема С.Д.Ейдельмана, В.О.Солонникова, Ж.Шабровського, С.Д.Івашишена, М.І.Матійчука та ін.

Значно менше досліджена задача Коші для параболічних систем з різними виродженнями і особливостями, коли, наприклад, система не є рівномірно параболічною, коефіцієнти системи необмежені в околі деяких точок або на безмежності і т.д. Задачі для такого типу систем виникають у теоретичних і прикладних дослідженнях. Тому вони є актуальними.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню задачі Коші для параболічних за Петровським систем і деяких вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова, які мають виродження на початковій гіперплощині.

З попередніх праць найбільшими за об'єктом дослідження і результатами є праці А.С.Калашникова, А.В.Глушака і С.Д.Шмулевича. Задача Коші для вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова без виродження на початковій гіперплощині досліджувалась у працях А.М.Колмогорова, М.Вебер, А.М.Іль'їна, І.М.Соніна, Г.Н.Малицької, С.Д.Ейдельмана, Л.М.Тичинської,

С.Д.Івасишена, Л.М.Андросової та ін.

МЕТА РОБОТИ. Побудова і дослідження властивостей фундаментальної матриці розв'язків (ФМР) та фундаментального розв'язку (ФР) задачі Коші для відповідно параболічних за Петровським систем і одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова, які мають виродження на початковій гіперплощині; застосування цих властивостей до дослідження коректної розв'язності систем і рівнянь з початковими умовами у випадку слабого виродження та без початкових умов, коли виродження сильне, а також інтегрального зображення і граничної поведінки розв'язків.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. При побудові та дослідженні ФМР задачі Коші використовується методика теорії рівномірно параболічних систем, зокрема перетворення Фур'є, метод Леві, метод характеристик для розв'язування диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку.

НАУКОВА НОВИЗНА РОБОТИ:

1) побудовано і досліджено ФМР та ФР задачі Коші для відповідно параболічних за Петровським систем та деяких вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова, які мають виродження на початковій гіперплощині;

2) досліджено коректну розв'язність такого типу систем із звичайною початковою умовою у випадку слабого виродження і без початкових умов, якщо виродження сильне;

3) у випадку слабого виродження знайдені необхідні й достатні умови зображення розв'язків таких систем у вигляді суми інтегралів Пуассона та об'ємних потенціалів; досліджено, в якому сенсі дані розв'язки задовольняють початкові умови, і описані множини початкових значень розв'язків; аналогічні результати одержані для однорідних рівнянь типу Колмогорова з виродженнями на початковій гіперплощині.

ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ. Робота носить теоретичний характер. Її результати можуть використовуватися при дослідженні коректної розв'язності і властивостей розв'язків задачі Коші для квазілінійних параболічних систем з виродженнями, а також вивченні математичних моделей конкретних

фізичних процесів, які описуються параболічними системами з виродженнями.

НА ЗАХИСТ ВНОСИТЬСЯ:

- побудова і властивості ФМР задачі Коші для параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині;

- властивості потенціалів, породжених ФМР задачі Коші для параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині;

- теореми про кофектну розв'язність параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині з початковою умовою у випадку слабого виродження і без початкових умов, якщо виродження сильне; необхідні та достатні умови, за яких визначені у напіввідкритому шарі розв'язки зображуються у вигляді суми інтегралів Пуассона функцій або узагальнених мір із спеціальних вагових просторів та об'ємних потенціалів, якщо виродження слабе;

- побудова та властивості ФР задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова; в яких є ще виродження на початковій гіперплощині;

- характеристика класу розв'язків однорідного виродженого параболічного рівняння типу Колмогорова у випадку слабого виродження на початковій гіперплощині, які зображуються у вигляді інтегралів Пуассона елементів спеціальних вагових просторів функцій та узагальнених мір.

АПРОБАЦІЯ РОБОТИ. Основні результати дисертації доповідались і обговорювались на Всеукраїнській науковій конференції "Нові підходи до розв'язання диференціальних рівнянь" (Дрогобич, 25-27 січня 1994 р.); науковій конференції, присвяченій 120-річчю заснування Чернівецького університету (Чернівці, 4-6 травня 1995 р.); міжнародній конференції "Нелінійні диференціальні рівняння" (Київ, 21-27 серпня 1995 р.); наукових семінарах кафедри математичного моделювання Чернівецького університету (Чернівці, 1992-1995 рр.); наукових семінарах Чернівецького відділу ІНПМ НАН України (Чернівці, 1992-1995 рр.).

ПУБЛІКАЦІЇ. Основні результати дисертації опубліковано в 8 роботах, список яких наведено в кінці автореферату.

Особисто дисертанткою побудовано і досліджено ФМР та ФР задачі Коші для відповідно параболічних за Петровським систем та деяких вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова з виродженнями на початковій гіперплощині; досліджено коректну розв'язність такого типу систем із звичайною початковою умовою у випадку слабого виродження і без початкових умов, якщо виродження сильне; у випадку слабого виродження знайдені необхідні й достатні умови інтегрального зображення розв'язків таких систем та однорідних рівнянь типу Колмогорова з виродженнями на початковій гіперплощині.

СТРУКТУРА І ОБСЯГ РОБОТИ. Дисертація складається із вступу, двох розділів та списку літератури. Обсяг дисертації 150 сторінок машинописного тексту. Бібліографічний список містить 35 найменувань.

ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовується актуальність теми роботи, робиться огляд результатів за тематикою дисертації та описуються одержані в роботі результати.

Список основних позначень містить ті позначення, які є загальними для всієї роботи.

Перший розділ, що складається з трьох параграфів, присвячений дослідженню задачі Коші для параболічних за Петровським систем з виродженням на початковій гіперплощині.

У § I розглядається система N рівнянь з частинними похідними

$$\begin{aligned} [\alpha(t)I D_t^k - \beta(t) \sum_{0 < |k| \leq 2b} a_k(t, x) D_x^k - a_0(t, x)] u(t, x) = \\ = f(t, x), (t, x) \in \Pi_{(0, T]}^n \equiv (0, T] \times \mathbb{R}^n, \end{aligned} \quad (I)$$

де функції $\alpha: [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ і $\beta: [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ неперервні, причому функція β монотонно неспадна, і такі, що

$$\alpha(0)\beta(0) = 0, \quad \forall t \in (0, T]: \alpha(t) > 0, \beta(t) > 0.$$

Для коефіцієнтів $a_k, |k| \leq 2b$, вважатимемо виконаними наступні умови.

Умова 1 (умова параболічності). Існує така стала $\delta > 0$,
що p -корені p_1, \dots, p_N рівняння

$$\det \left(\sum_{|k| \leq 2\delta} a_k(t, x) (i\sigma)^k - pI \right) = 0$$

задовольняють нерівності

$$\operatorname{Re} p_j(t, x, \sigma) \leq -\delta |\sigma|^{2\delta}, \quad 1 \leq j \leq N,$$

для довільних $(t, x) \in \Pi_{[0, T]}^n$ і $\sigma \in \mathbb{R}^n$.

Умова 2. Коефіцієнти a_k , $|k| \leq 2\delta$, обмежені і неперервні по t (при цьому неперервність коефіцієнтів з $|k| = 2\delta$ рівномірна по $x \in \mathbb{R}^n$), а також задовольняють у $\Pi_{[0, T]}^n$ умову Гельдера по x з показником $\lambda \in (0, 1)$.

Використовується також ще така умова.

Умова 3. Існують обмежені і неперервні по t похідні

$D_a^k a_k$, $|k| \leq 2\delta$, які задовольняють у $\Pi_{[0, T]}^n$ умову Гельдера по x з показником λ .

Оскільки система (1) вироджується при $t=0$, то не завжди для неї можна розглядати задачу Кові з початковими даними при $t=0$ у звичайній постановці. Але можна говорити про ФМР задачі Кові згідно з таким означенням.

Означення. ФМР задачі Кові для системи (1) називається квадратна матриця порядку N $Z(t, x; \tau, \xi)$, $0 < \tau < t \leq T$, $\{x, \xi\} \in \mathbb{R}^n$, така, що функція

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} Z(t, x; \tau, \xi) \varphi(\xi) d\xi, \quad (t, x) \in \Pi_{(\tau, T]}^n,$$

є розв'язком однорідної системи (1), який задовольняє умову

$$u(t, x)|_{t=\tau} = \varphi(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

для будь-якого $\tau \in (0, T)$ і довільної неперервної та обмеженої функції $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}_N$, де \mathbb{C}_N - сукупність усіх стовпчиків висоти N , елементи яких належать до \mathbb{C} .

Основні результати § 1 містяться в наступній теоремі.

Теорема 1.1. Нехай для коефіцієнтів a_k , $|k| \leq 2\delta$, виконуються умови 1 і 2. Тоді існує ФМР задачі Кові для системи (1) $Z(t, x; \tau, \xi)$, $0 < \tau < t \leq T$, $\{x, \xi\} \in \mathbb{R}^n$.

для якої правильні оцінки

$$|D_x^k Z(t, x; \tau, \xi)| \leq C [B(t, \tau)]^{-\frac{n+|k|}{2b}} E_c^d(t, \tau, |x - \xi|), \quad (2)$$

$$|\Delta_x^{\alpha'} D_x^k Z(t, x; \tau, \xi)| \leq C |x - x'|^{\alpha} [B(t, \tau)]^{-\frac{n+|k|+\alpha}{2b}} \times \\ \times [E_c^d(t, \tau, |x - \xi|) + E_c^d(t, \tau, |x' - \xi|)], \quad (3)$$

$$0 < \tau < t \leq T, \{x, x', \xi\} \in \mathbb{R}^n, |k| \leq 2b,$$

де $C > 0, c > 0, d \in \mathbb{R}, \Delta_x^{\alpha'} F(\cdot, x; \cdot, \cdot) \equiv F(\cdot, x; \cdot, \cdot) - F(\cdot, x'; \cdot, \cdot), B(t, \tau) \equiv \int_{\tau}^t \frac{\beta(\theta)}{\alpha(\theta)} d\theta, E_c^d(t, \tau, |x|) \equiv E_c(t, \tau, |x|) E^d(t, \tau) \equiv \exp\{-c [B(t, \tau)]^{1-q} |x|^q\} \times \\ \times \exp\{d \int_{\tau}^t \frac{d\theta}{\alpha(\theta)}\}, q = \frac{2b}{2b-1}.$

Як для рівномірно параболічних систем, побудова матриці Z здійснюється за допомогою методу Леві, згідно з яким вона відшукується у вигляді

$$Z(t, x; \tau, \xi) = Z_0(t, x; \tau, \xi; \xi) + \\ + \int_{\tau}^t \frac{d\theta}{\alpha(\theta)} \int_{\mathbb{R}^n} Z_0(t, x; \theta, y; y) \varphi(\theta, y; \tau, \xi) dy, \\ 0 < \tau < t \leq T, \{x, \xi\} \in \mathbb{R}^n,$$

де, на відміну від випадку систем без виродження, матриця $Z_0(t, x; \tau, \xi; y), 0 < \tau < t \leq T, \{x, \xi\} \in \mathbb{R}^n$, є ФМР задачі Коші для системи

$$[\alpha(t) I D_t^1 - \beta(t) \sum_{|k|=2b} a_k(t, y) D_x^k - a_0(t, y)] u(t, x) = 0, \\ (t, x) \in \Pi_{(0, T]}^n, y \in \mathbb{R}^n.$$

В оцінках (2) і (3) стала d може бути будь-якого значення або нулем. Якщо, наприклад, для системи (I) мають місце оцінки (2) і (3) з $d = d_0 > 0$, то відповідні оцінки для системи

$$[\alpha(t) I D_t^1 - \beta(t) \sum_{0 < |k| \leq 2b} a_k(t, x) D_x^k - a_0(t, x) + pI] u(t, x) =$$

$$= f(t, x), (t, x) \in \Pi_{(0, T]}^n, \quad (4)$$

з комплексним параметром p таким, що $\operatorname{Re} p > d_0$, правильні з $d = d_0 - \operatorname{Re} p < 0$, що випливає з формули

$$Z_p(t, x; \tau, \xi) = E^{-P}(t, \tau) Z(t, x; \tau, \xi), \\ 0 < \tau < t \leq T, [x, \xi] \subset \mathbb{R}^n,$$

де Z і Z_p - ФМР задачі Коші відповідно для систем (1) і (4).

Крім властивостей, описаних у теоремі I.1, в § I і 2 встановлені і деякі інші властивості матриці Z , а також властивості потенціалів, породжених цією матрицею. При цьому істотно розрізняються випадки слабого (інтеграл

$$\int \frac{ds}{\alpha(s)}$$

збігається) і сильного (цей інтеграл розбігається) вироджень.

Властивості ФМР дозволяють дослідити в § 3 коректну розв'язність системи (1) з початковою умовою

$$u(t, x)|_{t=0} = \varphi(x), x \in \mathbb{R}^n, \quad (5)$$

у випадку слабого виродження і без початкової умови, якщо має місце сильне виродження. Класи коректності при цьому складаються з функцій, які можуть зростати при $|x| \rightarrow \infty$ не швидше, ніж функція

$$\exp\{k(t)|x|^q\}, x \in \mathbb{R}^n,$$

$k(t) \equiv c_0 a [c_0^{2b-1} - a^{2b-1}(T - B(T, t))]^{1-q}$, $0 \leq t \leq T$, де c_0 - фіксована стала з проміжку $(0, c)$, а число a таке, що $0 \leq a < c_0 T^{1-q}$, c - стала з оцінок (2) і (3).

Нехай $u: \Pi_{[0, T]}^n \rightarrow C_N$ - задана неперервна або вимірна за Лебегом по x при повному фіксованому $t \in [0, T]$ функція. Для $t \in [0, T]$ і $1 \leq p < \infty$ означимо норми

$$\|u(t, \cdot)\|^{k(t)} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} [|u(t, x)| \exp\{-k(t)|x|^q\}],$$

$$\|u(t, \cdot)\|_p^{k(t)} = \| |u(t, \cdot)| \exp\{-k(t)|\cdot|^q\} \|_{L_p(\mathbb{R}^n)},$$

де $L_p(\mathbb{R}^n)$ - лебеговий простір функцій, визначених на \mathbb{R}^n із значеннями в C_N . Через $C^{k(0)}$ і $L_p^{k(0)}$ позначимо простори відповідно всіх неперервних і всіх вимірних за Лебегом функцій $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow C_N$, для яких скінченні відповідно норми $\|\varphi\|^{k(0)}$ і $\|\varphi\|_p^{k(0)}$. Через $M^{k(0)}$ позначимо сукупність усіх узагальнених борельових мір μ , заданих на σ -алгебрі \mathcal{B}_n борельових множин простору \mathbb{R}^n і таких, що

$$\|\mu\|^{k(0)} \equiv \int_{\mathbb{R}^n} \exp\{-k(0)|x|^q\} d|\mu|(x) < \infty,$$

де $|\mu|$ - повна варіація μ .

Для випадку слабкого виродження системи (I) при виконанні умов I-3 в § 3 доведені наступні три теореми.

Теорема 3.1. Нехай $\varphi \in C^{k(0)}$, а функція $\zeta: \Pi_{(0,T]}^n \rightarrow C_N$ неперервна, задовольняє в $\Pi_{(0,T]}^n$ локальну умову Гельдера по x та умову

$$\exists C > 0 \quad \forall t \in (0, T]:$$

$$F_0(t) \equiv \int_0^t [B(t, \tau)]^{-1 + \frac{1}{2b}} \|\zeta(\tau, \cdot)\|^{k(\tau)} \frac{d\tau}{\alpha(\tau)} \leq C,$$

тоді формулою

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} Z(t, x; 0, \xi) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \frac{d\tau}{\alpha(\tau)} \int_{\mathbb{R}^n} Z(t, x; \tau, \xi) \zeta(\tau, \xi) d\xi, \quad (t, x) \in \Pi_{(0,T]}^n, \quad (6)$$

визначається єдиний розв'язок системи (I), який задовольняє такі умови:

a) $\exists C > 0 \quad \forall t \in (0, T] \quad \forall m, |m| \leq 2b-1:$

$$\|D^m u(t, \cdot)\|^{k(t)} \leq C ([B(t, 0)]^{-\frac{|m|}{2b}} \|\varphi\|^{k(0)} + F_0(t));$$

б) для будь-якого компакту $K \subset \mathbb{R}^n$ рівномірно на K

$$u(t, \cdot) \xrightarrow{t \rightarrow 0+} \varphi(\cdot).$$

Теорема 3.2. Якщо $\varphi \in L_p^{k(0)}$, $1 \leq p \leq \infty$, а функція $f: \Pi_{(0,T]}^n \rightarrow C_N$ неперервна, задовольняє в $\Pi_{(0,T]}^n$ локальну умову Гельдера по x та умову

$$\exists C > 0 \quad \forall t \in (0, T]:$$

$$F_p(t) \equiv \int_0^t [B(t, \tau)]^{-1 + \frac{1}{2\delta}} \|f(\tau, \cdot)\|_p^{k(\tau)} \frac{d\tau}{\alpha(\tau)} \leq C, \quad (7)$$

то формула (6) визначає єдиний розв'язок системи (I), для якого виконуються такі умови:

$$а) \exists C > 0 \quad \forall t \in (0, T] \quad \forall m, |m| \leq 2\delta - 1:$$

$$\|D^m u(t, \cdot)\|_p^{k(t)} \leq C ([B(t, 0)]^{-\frac{|m|}{2\delta}} \|\varphi\|^{k(0)} + F_p(t));$$

$$б) \text{ при } 1 \leq p < \infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \|u(t, \cdot) - \varphi(\cdot)\|_p^{k(t)} = 0,$$

а при $p = \infty$ $u(t, \cdot) \xrightarrow[t \rightarrow 0+]{cu} \varphi(\cdot)$, тобто мають місце співвідношення

$$\forall \eta \in L_1^{-k(T)}:$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \int_{\mathbb{R}^n} \eta'(x) u(t, x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \eta'(x) \varphi(x) dx;$$

де $L_1^{-k(T)}$ - множина всіх вимірних за Лебегом функцій $\eta: \mathbb{R}^n \rightarrow C_N$, для яких скінченна норма

$$\|\eta\|_1^{-k(T)} \equiv \|\exp\{k(T)|\cdot|^q\} \eta(\cdot)\|_{L_1(\mathbb{R}^n)}.$$

Теорема 3.3. Нехай $\mu \in M^{k(0)}$, а функція f така ж, як у теоремі 3.2, причому умову (7) задовольняє з $p = 1$ тоді формулою

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} Z(t, x; 0, \xi) d\mu(\xi) + \int_0^t \frac{d\tau}{\alpha(\tau)} \int_{\mathbb{R}^n} Z(t, x; \tau, \xi) f(\tau, \xi) d\xi,$$

$$(t, x) \in \Pi_{(0,T]}^n, \quad (8)$$

визначається єдиний розв'язок системи (I), який має такі

властивості:

$$a) \exists C > 0 \quad \forall t \in (0, T] \quad \forall m, |m| \leq 2b-1:$$

$$\|D_t^m u(t, \cdot)\|_1^{k(t)} \leq C ([B(t, 0)]^{-\frac{|m|}{2b}} \|\mu\|^{k(t)} + F_1(t));$$

$$b) u(t, \cdot) \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{Ct} \mu, \text{ тобто правильні співвідношення}$$

$$\forall \eta \in C_0^{-k(T)}:$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}^n} \eta'(x) \overline{u(t, x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \eta'(x) d\mu(x),$$

де $C_0^{-k(T)}$ - множина всіх таких неперервних функцій η :

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}_N, \text{ що } |\eta(x)| \exp\{k(T)|x|^q\} \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0.$$

Якщо має місце сильне виродження, то початкову умову (5) задовольнити, взагалі кажучи, не можна. У наступній теоремі наводяться умови, за яких існує єдиний розв'язок сильно виродженої системи (I) без початкових умов.

Теорема 3.5. Нехай виконуються умови I-3 і має місце сильне виродження. Якщо функція $f: \Pi_{(0, T]}^n \rightarrow \mathbb{C}_N$ неперервна, задовольняє в $\Pi_{(0, T]}^n$ таку локальну умову Гельдера по x :

$$\forall R > 0 \exists L > 0 \exists \lambda \in (0, 1] \quad \forall t \in (0, T] \quad \forall \{x, \xi\} \in K_R^n:$$

$$|f(t, x) - f(t, \xi)| \leq L \delta(t) E^{-d}(T, t) |x - \xi|^\lambda,$$

де $\delta: (0, T] \rightarrow [0, \infty)$ - функція, яка задовольняє умову

$$\int_0^T \frac{\delta(t)}{\alpha(t)} dt < \infty, \quad K_R^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq R\}, \text{ а } d - \text{ стала}$$

з оцінок (2), та умову

$$F(t) \equiv \int_0^t E^d(t, \tau) \|f(\tau, \cdot)\|^{k(\tau)} \frac{d\tau}{\alpha(\tau)} \leq C,$$

то формула

$$u(t, x) = \int_0^t \frac{d\tau}{\alpha(\tau)} \int_{\mathbb{R}^n} Z(t, x; \tau, \xi) f(\tau, \xi) d\xi,$$

$$(t, x) \in \Pi_{(0, T]}^n,$$

визначає єдиний розв'язок системи (I), для якого правильна

оцінка

$$\|u(t, \cdot)\|^{k(t)} \leq C E^{-d}(T, t) F(t), t \in (0, T].$$

В п. 3.2 для системи (I) із слабким виродженням доведена наступна теорема, яка є у певному розумінні оберненою до теорем 3.2 і 3.3.

Теорема 3.4. Нехай для розв'язку u і правої частини f системи (I) із слабким виродженням виконуються такі умови:

а) $\exists C > 0 \quad \forall t \in (0, T] : \|u(t, \cdot)\|_p^{k(t)} \leq C$

з деяким $p \in [1, \infty]$;

б) f задовольняє умови з теореми 3.2.

Тоді при $1 < p \leq \infty$ існує єдина функція $\varphi \in L_p^{k(0)}$, а при $p = 1$ - єдина узагальнена міра $\mu \in M^{k(0)}$ такі, що розв'язок u зображується відповідно у вигляді (6) і (8).

Наслідок. З теорем 3.2-3.4 випливають такі твердження: за умов на f з цих теорем

1) простори $L_p^{k(0)}$ і $M^{k(0)}$ є множинами початкових значень розв'язків системи (I) тоді і тільки тоді, коли розв'язки задовольняють умову а) з теореми 3.4 при $1 < p \leq \infty$ і $p = 1$ відповідно;

2) для зображення розв'язків системи (I) у вигляді (6) чи (8) необхідно й досить, щоб виконувалась умова а) з теореми 3.4.

Другий розділ, до якого входять § 4-6, присвячений дослідженню задачі Коші для виродженого параболічного рівняння типу Колмогорова, в якого є ще виродження на початковій гіперплощині.

Розглядається рівняння вигляду

$$[\alpha(t) D_t^1 - \beta(t) (\sum_{j=1}^m x_j D_{y_j}^1 + \sum_{j=1}^l y_j D_{z_j}^1 + \sum_{0 < |k| \leq 2b} a_k(t) D_x^k) -$$

$$- a_0(t)] u(t, X) = 0, (t, X) \in \Pi_{(0, T]}^L \equiv (0, T] \times \mathbb{R}^L, \quad (9)$$

де $X \equiv (x, y, z) \in \mathbb{R}^L$, $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$, $z = (z_1, \dots, z_l) \in \mathbb{R}^l$, $1 \leq l \leq m \leq n$, $L \equiv l + m +$

+n. Коефіцієнти $a_k: [0, T] \rightarrow \mathbb{C}$, $0 < |k| \leq 26$, $a_0: (0, T] \rightarrow \mathbb{C}$ неперервні і такі, що вираз

$$D_t^4 - \sum_{0 < |k| \leq 26} a_k(t) D_x^k$$

рівномірно параболічний за Петровським. $\exists A \in \mathbb{R} \forall t \in (0, T]:$

$\operatorname{Re} a_0(t) \leq A$, а функції α і β такі ж, як у першому розділі.

У § 4 побудовані ФР $Z(t, X; \tau, \Xi)$, $0 < \tau < t \leq T$, $\{X, \Xi\} \subset \mathbb{R}^L$, задачі Коші для рівняння (9) і досліджені його властивості. Зокрема, одержані такі оцінки:

$$|D_x^k D_y^s D_\Xi^s(t, X; \tau, \Xi)| \leq C [B(t, \tau)]^{-M(k, s, s)} \times$$

$$\times \Phi_c^d(t, X; \tau, \Xi), \tau < t \leq T, \{X, \Xi\} \subset \mathbb{R}^L,$$

де $M(k, s, s) \equiv \frac{1}{26} [n + |k| + (26+1)(m + |s|) + (46+1)(l + |s|)]$,

$C > 0$, $c > 0$, $d \in \mathbb{R}$, $\Phi_c^d(t, X; \tau, \Xi) \equiv \exp \left\{ d \int_\tau^t \frac{d\theta}{\alpha(\theta)} - \right.$

$$\left. - c \left(\frac{|x - \xi|^q}{[B(t, \tau)]^{q-1}} + \frac{|y + B(t, \tau)\hat{x} - \eta|^q}{[B(t, \tau)]^{2q-1}} + \frac{|z + B(t, \tau)y' + \frac{1}{2}[B(t, \tau)]^2 x' - \zeta|^q}{[B(t, \tau)]^{3q-1}} \right) \right\}.$$

Властивості ФР задачі Коші дозволяють одержати для рівнянь вигляду (9) (як однорідних, так і неоднорідних) результати, аналогічні результатам з першого розділу. Вони стосуються у випадку слабкого виродження на початковій гіперплощині коректної розв'язності задачі Коші, інтегрального зображення та граничної поведінки розв'язків, визначених у напіввідкритому нарі $\Pi^L(0, T)$, а у випадку сильного виродження - коректної розв'язності неоднорідного рівняння без початкових умов у відповідних просторах функцій. У § 5 і 6 наведені лише деякі результати для однорідного рівняння (9) у випадку слабкого виродження на початковій гіперплощині.

Щоб їх сформулювати, означимо потрібні норми і простори. Для кожного $t \in [0, T]$ покладемо $\|u(t, \cdot)\|_p^{k(t, a)} \equiv \|u(t, x) \times$

$$x \exp \{-k_1(t, a_1)|x|^q - k_2(t, a_2)|y|^q + B(t, 0)\hat{x}|^q - \\ - k_3(t, a_3)|z|^q + B(t, 0)y' + \frac{1}{2}[B(t, 0)]^2 x'|^q\} \|_{L_p(\mathbb{R}^L)},$$

де $1 \leq p \leq \infty$,

$$k(t, a) \equiv (k_1(t, a_1), k_2(t, a_2), k_3(t, a_3)), \\ k_j(t, a_j) \equiv c_0 a_j [c_0^{2^j-1} - a^{2^j-1} (T - B(T, t))^{2^j(j-1)+1}]^{1-q}, \\ 0 \leq t \leq T, 0 \leq a_j < c_0 T^{\frac{2^j(j-1)+1}{2^j}}.$$

Через $L_p^{k(0, a)}$, $1 \leq p \leq \infty$, позначимо простір усіх комплекснозначних функцій $\varphi(X)$, $X \in \mathbb{R}^L$, які вимірні і для яких скінченна норма $\|\varphi\|_p^{k(0, a)}$, а через $M^{k(0, a)}$ сукупність усіх узагальнених борельових мір μ , заданих на σ -алгебрі \mathcal{B}_L борельових множин простору \mathbb{R}^L , і таких, що

$$\|\mu\|^{k(0, a)} \equiv \int_{\mathbb{R}^L} \exp \{-k_1(0, a_1)|x|^q - k_2(0, a_2)|y|^q - \\ - k_3(0, a_3)|z|^q\} d|\mu|(X).$$

Покладаємо ще

$$\|u(t, \cdot)\|_p^{s(t)} \equiv \|u(t, X) \exp \{-s_1(t)|x|^q - \\ - s_2(t)|y|^q - s_3(t)|z|^q\}\|_{L_p(\mathbb{R}^L)},$$

де

$$s_1(t) \equiv k_1(t, a_1) + 2^{q-1} [B(t, 0)]^q k_2(t, a_2) + \\ + 2^{-q} 3^{q-1} [B(t, 0)]^{2q} k_3(t, a_3), \\ s_2(t) \equiv 2^{q-1} k_2(t, a_2) + 3^{q-1} [B(t, 0)]^q k_3(t, a_3), \\ s_3(t) \equiv 3^{q-1} k_3(t, a_3).$$

$$s(t) \equiv (s_1(t), s_2(t), s_3(t)), 0 \leq t \leq T,$$

Теорема 6.1. Нехай має місце слабе виродження і $1 \leq p < \infty$. Тоді:

а) для будь-якої функції $\varphi \in L_p^{k(0, a)}$ формулою

$$u(t, X) \equiv \int_{\mathbb{R}^L} Z(t, X; 0, \Xi) \varphi(\Xi) d\Xi, \quad (10)$$

$$(t, X) \in \Pi_{(0, T]}^L,$$

визначається єдиний розв'язок рівняння (3) у шарі $\Pi_{(0, T]}^L$ який задовольняє такі умови:

1) існує стала $C > 0$, не залежна від φ і така, що

$$\forall t \in (0, T]: \|u(t, \cdot)\|_p^{k(t, a)} \leq C \|\varphi\|_p^{k(0, a)},$$

2) при $1 \leq p < \infty$ $\lim_{t \rightarrow 0^+} \|u(t, \cdot) - \varphi(\cdot)\|_p^{s(t)} = 0$,

а при $p = \infty$ $u(t, \cdot) \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} \varphi(\cdot)$, тобто

$$\forall \varphi \in L_1^{-s(T)};$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}^L} u(t, X) \varphi(X) dX = \int_{\mathbb{R}^L} \varphi(X) \psi(X) dX,$$

де $L_1^{-s(T)}$ - множина комплекснозначних вимірних функцій

$\varphi(X)$, $X \in \mathbb{R}^L$, для яких скінченна норма

$$\|\varphi\|_1^{-s(T)} \equiv \|\varphi(X) \exp\{s_1(T)|x|^2 + s_2(T)|y|^2 + s_3(T)|z|^2\}\|_{L_1(\mathbb{R}^L)};$$

б) для будь-якої узагальненої міри $\mu \in M^{k(0, a)}$ формула

$$u(t, X) = \int_{\mathbb{R}^L} Z(t, X; 0, \Xi) d\mu(\Xi),$$

$$(t, X) \in \Pi_{(0, T]}^L, \quad (11)$$

визначає єдиний розв'язок рівняння (9) у шарі $\Pi_{(0, T]}^L$, який має такі властивості:

1) існує така, не залежна від μ , стала $C > 0$, що

$$\forall t \in (0, T]: \|u(t, \cdot)\|_2^{k(t, a)} \leq C \|\mu\|^{k(0, a)},$$

2) $u(t, \cdot) \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} \mu$, тобто $\forall \varphi \in C_0^{-s(T)}$:

$$\int_{\mathbb{R}^L} \varphi(X) u(t, X) dX \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} \int_{\mathbb{R}^L} \varphi(X) d\mu(X),$$

де $C_0^{-s(\Gamma)}$ - множина всіх комплексозначних неперервних функцій $\varphi(X)$, $X \in \mathbb{R}^L$, які мають властивість

$$|\varphi(X)| \exp\{s_1(\Gamma)|x|^q + s_2(\Gamma)|y|^q + s_3(\Gamma)|z|^q\} \longrightarrow 0 \text{ при } |X| \longrightarrow \infty.$$

Оберненою до теореми 6.1 є теорема про зображення у вигляді інтегралів Пуассона розв'язків, визначених у напіввідкритому шарі.

Теорема 6.2. Нехай має місце слабе виродження і u - розв'язок рівняння (9) у шарі $\Pi(0, \Gamma)$, який задовольняє умову

$$\forall t \in (0, \Gamma]: \|u(t, \cdot)\|_p^{k(t, a)} \leq C \quad (12)$$

з деякими $C > 0$ і $1 \leq p \leq \infty$. Тоді при $1 < p \leq \infty$ існує єдина функція $\varphi \in L_p^{k(0, a)}$, а при $p=1$ - єдина узагальнена міра $\mu \in M^{k(0, a)}$ такі, що розв'язок u зображується у вигляді (10) і (11) відповідно.

Наслідок. З теорем 6.1 і 6.2 випливає що

1) простори $L_p^{k(0, a)}$, $1 < p \leq \infty$, і $M^{k(0, a)}$ є множинами початкових значень розв'язків рівняння (9) тоді і тільки тоді, коли розв'язки задовольняють умову (12) при $1 < p \leq \infty$ і $p=1$ відповідно;

2) для зображення розв'язків рівняння (9) у вигляді (10) чи (11) з $\varphi \in L_p^{k(0, a)}$, $1 < p \leq \infty$, і $\mu \in M^{k(0, a)}$ необхідно й досить, щоб виконувалась умова (12).

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ

Побудована і досліджена ФМР задачі Коші для параболічних за Петровським систем з виродженням на початковій гіперплощині. Досліджені властивості потенціалів, породжених ФМР задачі Коші для таких систем. Ці властивості використані для доведення теорем про коректну розв'язність та інтегральне зображення розв'язків.

Побудований і досліджений ФР задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова, які мають ще виродження на початковій гіперплощині. Для однорідних рівнянь з такого класу у випадку слабого виродження на початковій гіперплощині описаний клас розв'язків, які зображуються у вигляді інтегралів Пуассона елементів спеціальних вагових просторів.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНІ В РОБОТАХ:

1. Возняк О.Г., Івасишин С.Д. Задача Коші для параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині // Доп. НАН України.- 1994.- № 6.- С. 7-11.
2. Возняк О.Г. Про задачу Коші для деяких параболічних систем з виродженням // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения.- Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1994.- С. 48-49.
3. Возняк О.Г., Івасишин С.Д. Фундаментальні матриці розв'язків задачі Коші для параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині.- Чернівць. ун-т.- Чернівці, 1995.- 51 с.- Деп. в ДНТБ України: 12.07.95, № 1808-Укр95.
4. Возняк О.Г. Про інтегральне зображення розв'язків параболічних систем з виродженням // Матеріали міжнародної математичної конференції, присвяченої пам'яті Ганса Гана.- Чернівці: Рута, 1995.- С. 42-60.
5. Возняк О.Г. Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь // Матеріали наукової конференції викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету (4-6 травня 1995 року). Том 2. Фізико-математичні науки.- Чернівці: Рута, 1995.- С. 79.
6. Возняк О.Г., Івасишин С.Д. Фундаментальний розв'язок задачі Коші для параболічного рівняння другого порядку з виродженням по часу // Тези доповідей наукової конференції викладачів та студентів Географічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету.- Тернопіль, 1992.- С. 169-170.

7. Возняк О.Г., Івасишен С.Д. Про задачу Коші для параболічного рівняння з виродженням // Тези доповідей наукової конференції викладачів та студентів географічного факультету Тернопільського педінституту.- Тернопіль, 1992.- С. 106-107.
8. Возняк О.Г., Івасишен С.Д. Задача Коші для параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції "Нові підходи до розв'язання диференціальних рівнянь" (25-27 січня 1994 року, м. Дрогобич).- Київ, 1994.- С. 31.

Voznuak O.G. The Cauchy problem for the parabolic systems with the degenerations. Manuscript. Thesis for a degree of Candidate of Science (Ph.D) in Physics and Mathematics , speciality 01.01.02 - Differential Equations Chernivtsi State University , Chernivtsi , 1995 .

The parabolic systems with the degenerations on the initial hyperplane and the some degenerate parabolic equations are considered . These equations are the same as the Kolmogorov's equation of diffusion with inertia and they have the degenerations on the initial hyperplane . The fundamental matrixes of the solutions of the Cauchy problem are constructed for such systems and equations , their properties are investigated and some applications of these properties are obtained.

Возняк О.Г. Задача Коши для параболических систем с вырождениями . Рукопись . Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико - математических наук по специальности 01.01.02 - дифференциальные уравнения . Черновицкий государственный университет , Черновцы , 1995 .

Рассматриваются параболические системы с вырождениями на начальной гиперплоскости и некоторые вырожденные параболические уравнения типа уравнения диффузии с инерцией Колмогорова , в которых имеются ϵ, ϵ вырождения на начальной гиперплоскости . Построены фундаментальные матрицы решений задачи Коши для таких систем и уравнений , изучены их свойства , приведены некоторые применения этих свойств .

КЛЮЧОВІ СЛОВА : параболическая система с вырождениями , задача Коши , фундаментальная матрица решений задачи Коши , фундаментальный разрывок задачи Коши , интеграл Пуассона .

О.В.В. -

Підписано до друку 19.09.95

Формат 60 x 84/16


Папір друкарський

Друк офсетний. Ум. друк. арк.1,16

Обл.- вид.арк.1,17.

Зам. 031

Друкарня видавництва "Рута" Чернівецького держуніверситету.
274012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.



AB 32.993